



Requisiti per la madre di becco



Requisito							Perdita dello stato di madre di becco	
Generazioni di ascendenti	Una madre di becco delle seguenti razze deve mostrare almeno 2 generazioni di ascendenti : Capra di Saanen, Capra Camosciata delle Alpi, Capra del Toggenburgo, Capra Buren							Se le generazioni di ascendenti sono in seguito omesse.
	Una madre di becco delle seguenti razze deve mostrare almeno 1 generazione di ascendenti : Capra d'Appenzello, Capra Striata grigionese, Nera Verzasca, Capra dal Collo nero del Vallese, Capra Pavone, Anglo Nubian, Tauernschecken Austriaca							
Le seguenti razze non hanno alcun requisito per le generazioni di ascendenti: Capra Sempione, Capra dal Collo rosso, Capra dal Collo grigio								
Genitori	Madre	Almeno nota 2 in tutte le posizioni						
	Padre	Il padre deve essere becco da riproduzione						
Produttività individuale	Morfologia	Almeno la nota 3 in tutte le posizioni della valutazione morfologica (3/3/3/3/3) per le razze: Capra di Saanen, Capra Camosciata delle Alpi, Capra del Toggenburgo, Capra d'Appenzello, Capra Striata grigionese, Nera Verzasca, Capra dal Collo nero del Vallese, Capra Pavone, Anglo Nubian, Capra Buren, Tauernschecken Austriaca					Se l'animale è rivalutato dalla Commissione di conciliazione e pertanto la nota minima (3) non viene più raggiunta.	
	Produttività	Minima la nota 2 in tutte le posizioni della valutazione morfologica (2/2/2/2/2) per le razze: Capra Sempione, Capra dal Collo rosso, Capra dal Collo grigio						
		Razza	Chiusura standard Numero giorni	Punti latte (PL)	Proteine %	Valori genetici totali	Se all'animale è stato erroneamente attribuito lo stato di madre di becco senza adempierlo (ad esempio a causa di un errore di sistema).	
		SA	220	82	2.7	≥ 97		
		AP	220	73	0.0			
		TO	220	77	2.7	≥ 97		
		GG	220	71	2.8	≥ 97		
		BS	180	48	2.7			
		NV	120	Almeno 1 chiusura di lattazione standard EFL senza i requisiti di PL				
		SH	180	Almeno 1 chiusura EFA (L) o 48 PL				
		PF	180	48	0.0			
		AN	220	60	3.3			
		BU		Almeno 1 chiusura ECS (L)				
		TS	180	48	0.0			
		CS	Nessun requisito alla produttività					
		KH	Nessun requisito alla produttività					
		GO	Nessun requisito alla produttività					

Requisiti per becco da riproduzione / padre di becco



Requisito			Perdita dello stato di becco da riproduzione risp. di padre di becco
Generazioni di ascendenti		<p>Un becco da riproduzione delle seguenti razze deve mostrare almeno 3 generazioni di ascendenti: Capra di Saanen, Capra Camosciata delle Alpi, Capra del Toggenburgo, Capra Buren</p> <p>Un becco da riproduzione delle seguenti razze deve mostrare almeno 2 generazioni di ascendenti: Capra d'Appenzello, Capra Striata grigionese, Nera Verzasca, Capra dal Collo nero del Vallese, Capra Pavone, Anglo Nubian, Tauernschecken Austriaca</p> <p>Le seguenti razze non hanno alcun requisito per le generazioni di ascendenti: Capra Sempione, Capra dal Collo rosso, Capra dal Collo grigio</p>	
Genitori	Madre	La madre deve adempiere i requisiti per le madri di becco.	
	Padre	Il padre deve adempiere i requisiti per i padri di becco.	
Produttività individuale	Morfologia	<p>I becchi possono essere punteggiati all'età minima di sessanta giorni. I becchi fino all'età di quattro anni compiuti devono di norma essere oggetto di una valutazione annuale. Nel primo anno di monta almeno una valutazione è obbligatoria. La valutazione morfologica è facoltativa per becchi con più di quattro anni.</p> <p>Requisiti per becco da riproduzione: Minima la nota 2 in tutte le posizioni della valutazione morfologica (2/2/2(2)) per le razze. → Per l'ulteriore riproduzione possono essere utilizzati solo discendenti femminili. → Il becco deve soddisfare le condizioni durante l'anno di monta.</p> <p>Requisiti per padre di becco: Minima la nota 2 in tutte le posizioni della valutazione morfologica (2/2/2/2/2) per le razze: Capra di Saanen, Capra Camosciata delle Alpi, Capra del Toggenburgo, Capra d'Appenzello, Capra Striata grigionese, Nera Verzasca, Capra dal Collo nero del Vallese, Capra Pavone, Anglo Nubian, Capra Buren, Tauernschecken Austriaca. Per le razze Capra Sempione, Capra dal Collo rosso e Capra dal Collo grigio è sufficiente la nota 2.</p>	<p>Se l'animale è rivalutato dalla Commissione di conciliazione e pertanto la nota minima (3) non viene più raggiunta.</p> <p>Se all'animale è stato erroneamente attribuito lo stato di madre di becco senza adempierlo (ad esempio a causa di un errore di sistema).</p>
	Profilo DNA	Al più tardi alla prima valutazione del becco, una persona incaricata dalla FSAC procede al prelievo di un campione per la determinazione del profilo DNA. La registrazione del punteggio è soltanto possibile in presenza di un profilo DNA.	Se le generazioni di ascendenti sono in seguito omesse.

